

8. 接種HPV疫苗後何時才可懷孕？

完成整個接種療程後，最少相隔一個月才可懷孕。

9. HPV疫苗效果可維持多久？

完成整個接種療程後，有效保護期約為10年。

10. 完成整個接種療程後，是否不用再作任何檢查？

接種疫苗只為對疫苗所含之HPV類型提供保護作用，並不代表有100%之防禦或治療，建議定時每年作適切之婦科檢查。

11. 整個接種療程應於多久內完成？

根據現時最普遍的HPV疫苗藥廠建議，整個接種療程應於一年內完成。三劑疫苗接種可於4個月至1年內完成，一般可於6個月內就可完成所有接種。接種第一劑疫苗後相隔最少1至2個月可接種第二劑疫苗；第三劑疫苗必需在接種第二劑疫苗後相隔最少3至4個月內接種。



養和家庭醫學及基層醫療中心

跑馬地

養和醫院

香港跑馬地山村道2號李樹培院地下

電話：(852) 2835 8600 傳真：(852) 2892 7506

opd@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

中環

養和醫健

香港中環德輔道中33號1樓

電話：(852) 2523 7887 傳真：(852) 2523 7873

fmccn@hksh-healthcare.com

北角

養和醫健

香港北角丹拿道8號雋悅3樓

電話：(852) 2219 9012 傳真：(852) 2892 7572

fmcth@hksh-healthcare.com

太古

養和醫健

香港鰂魚涌太古城道39號匯豪峰A - C舖

電話：(852) 2563 6655 傳真：(852) 2892 7560

fmctk@hksh-healthcare.com

www.hksh-healthcare.com

港島東

養和李樹芳樓

香港筲箕灣阿公岩村道5號5樓

電話：(852) 2917 1180 傳真：(852) 2892 7403

fmc@hksh-emc.com

www.hksh-emc.com

查詢或預約，歡迎聯絡我們



人類乳頭瘤 病毒(HPV) 及HPV疫苗



養和家庭醫學及
基層醫療中心

HKSH Family Medicine and
Primary Care Centre


www.hksh.com

人類乳頭瘤病毒(HPV)

人類乳頭瘤病毒 (Human Papillomaviruses, HPV) 可引致的疾病包括子宮頸癌、外陰癌及陰道癌、肛門癌、頭頸癌、咽喉腫塊以及生殖器官濕疣 (椰菜花)。

人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗

人類乳頭瘤病毒疫苗 (又稱子宮頸癌疫苗, 簡稱HPV疫苗) 是一種預防性疫苗, 能預防子宮頸癌及其他因感染HPV而引致的癌症和疾病。現時在香港註冊的HPV疫苗均屬處方藥物, 必須經註冊醫生的臨床評估, 方可使用。



根據衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和愛滋病及性病科學委員會建議, 9價HPV疫苗能預防近九成的子宮頸癌。

疫苗	9價HPV疫苗
可預防的HPV類型	HPV 6,11,16,18, 31,33,45,52,58
接種對象	9歲起 (女性及男性)
可預防由HPV感染引起的疾病	子宮頸癌、性病疣
本港建議注射的劑量及方式	9至14歲: 2針 15歲或以上: 3針

適合接種HPV疫苗的人士

對於從未感染HPV的女性, 尤其是未有性行為的女性, 接種HPV疫苗最為有效。對於已有性行為的女性, 疫苗的功效則因人而異, 詳情請向醫生查詢。

常見副作用

常見的副作用與其他疫苗相似, 包括注射部位出現紅腫和疼痛、發燒、頭痛和作嘔。如有疑問, 請向醫生查詢。

不建議在以下情況接種HPV疫苗

- 懷孕婦女 (接種HPV疫苗期間應避免懷孕)
- 發燒
- 對HPV疫苗的任何成分過敏
- 曾接種HPV疫苗並出現過敏症狀

正接受免疫抑制治療、有遺傳缺陷、感染人類免疫缺陷病毒或因其他原因而出現自身免疫系統受損、血小板減少或有凝血障礙的人士, 應先諮詢醫生意見。

接種HPV疫苗後, 我仍需要接受子宮頸癌篩查嗎?

接種HPV疫苗後, 婦女必須繼續進行子宮頸癌篩查, 因為HPV疫苗不能清除已帶有的HPV感染, 亦不能預防HPV疫苗沒有包含的其他HPV類型病毒。

常見問題

1. 懷孕婦女為何不適宜注射HPV疫苗?

HPV疫苗主要用於預防人類乳頭瘤病毒感染, 從而減少子宮頸癌和其他相關疾病的風險。

但由於有關孕婦接種HPV疫苗的安全性和有效性的研究和臨床試驗仍然有限, 目前還未有足夠的資料建議孕婦在懷孕期間接種HPV疫苗。

2. 如果婦女在接種兩劑HPV疫苗後懷孕, 是否應繼續接種第三劑?

若婦女未完成接種三劑HPV疫苗前懷孕, 建議分娩後就接種安排諮詢醫生意見。

3. HPV疫苗能同時與其他疫苗一起接種嗎?

可以。

4. 傷風、感冒或身體不適時, 能接種HPV疫苗嗎?

如果你患有感冒、流感或其他症狀輕微的身體不適, 你可以如期接種HPV疫苗。但是, 如果你發燒並感到嚴重不適, 則應等到痊癒後再接種。

5. 如有食物或藥物過敏, 可接種HPV疫苗嗎?

如果對HPV疫苗中含有蛋白質的成份有過敏反應, 並不建議接種。

6. 接種前應否先作婦科檢查?

一般來說, 適合接種HPV疫苗的人士毋須事先進行婦科檢查。

不過, 我們建議婦女定期進行婦科檢查, 包括子宮頸癌和其他疾病的篩查以確保生殖健康。如果你要進行常規婦科檢查, 這可能是一個好機會向你的醫生諮詢你就HPV疫苗可能有的問題或疑慮。

7. 接種HPV疫苗有哪些常見副作用?

臨床中最常見的副作用有頭痛、頭暈、噁心、發燒等, 而接種部位疼痛、腫痛或紅斑亦可能會出現。