

激光治療白內障手術後後囊混濁

白內障手術後一至兩年內，支撐著人工晶體的透明囊膜可能會變得混濁，這種混濁情況會導致視力模糊。因此，有可能須進行激光晶狀體囊切開術，使用激光在混濁的囊膜上製造一個小孔，手術過程只需數分鐘，便能恢復清晰視力。

定期檢查 保護視力

請定期接受眼科檢查，以便及早診斷和治療各種眼疾，確保眼睛健康，為您守護視力。

養和眼科中心

跑馬地

養和醫院

香港跑馬地山村道2號李樹芬院4樓

電話：(852) 2835 8880 : (852) 2835 8890

傳真：(852) 2892 7510

eye@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

金鐘

養和醫健專科中心

香港金鐘道88號太古廣場一座21樓

電話：(852) 2855 6700

傳真：(852) 2523 7660

eye@hksh-healthcare.com

www.hksh-healthcare.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

查詢或預約，歡迎聯絡我們



白內障



養和眼科部

© HKSH Medical Group Limited. All rights reserved.
Members of HKSH Medical Group

OPH.1131H/C-09-032025

養和眼科部

HKSH Department of Ophthalmology

www.hksh.com

我患有白內障嗎？

白內障是指眼球內的晶狀體混濁。晶狀體的功能就像自動對焦相機的鏡頭一樣，將影像自動聚焦在視網膜上；當晶狀體變得不透明時，就會出現白內障。

患有白內障的眼睛，視力會變得模糊不清，在陽光或光亮的環境之下視物會有眩光，間中會見到疊影或多重影像，而物件原有的顏色亦逐漸變得黯淡或褪色。

有些白內障患者由於近視加深，閱讀時不再需要老花眼鏡，但看遠物時卻變得模糊。

當白內障成熟時，晶狀體會變白，視力下降到只能看見揮手動作，或只感受到光線照射。

過熟的白內障會引發青光眼和虹膜炎，令患者出現眼睛紅腫、疼痛、怕光、頭痛、噁心和嘔吐等症狀。




鮮明的顏色逐漸變得黯淡




病人視力模糊不清

白內障是怎樣形成的？

白內障患者一般是60歲或以上的長者。隨着年齡增長，晶狀體自然老化，晶狀體蛋白質因化學變化而變得混濁，形成白內障。白內障亦可影響較年輕的患者，尤其是患有深近視、糖尿病、濕疹或其他遺傳性退化疾病的人士。此外，如眼睛曾經受傷、長期使用類固醇和長期暴露在紫外線或紅外線下的人士，亦可能出現繼發性白內障。



白內障




術後第一日


眼藥水和口服藥物能治療白內障嗎？

沒有藥物可以使白內障回復清澈透明。現時，必須透過手術移除白內障及植入人工晶體作為治療。

嶄新手術可恢復視力，減少屈光不正（近視、遠視、散光及老花）



超聲波乳化白內障



植入摺疊式人工晶體

初期白內障對視力並沒有明顯的影響，故此並不需要醫治。如果只是近視輕微增加，更換眼鏡度數便可使視力回復正常。


當視力下降影響工作或生活質素，便可以考慮接受白內障手術，不必等到白內障成熟才動手術。

傳統的白內障手術會先於角膜緣作一大切口，取出白內障，再植入人工晶體，然後以極細縫針把傷口縫上。新式微創白內障手術會使用超聲波乳化，經角膜緣的小切口吸出乳化後的白內障，再植入摺疊式人工晶體。術後傷口會自動癒合，一般都不用縫線，或只需縫一針。手術可以施行表面麻醉，或按需要選擇其他麻醉方法。

人工晶體

經手術植入合適的人工晶體，可矯正術前的近視、遠視或散光。如植入矯正老花的人工晶體，更可清晰地看到遠、中及近距離的事物，從而消除或大大減低對老花眼鏡的依賴。

視乎術前計劃及術後屈光情況，患者仍可能需要配戴眼鏡或隱形眼鏡，以矯正餘下的屈光不正。



各款植入摺疊式人工晶體，包括基本單焦距、散光及多焦距人工晶體等，可解決不同的視力問題