

跑馬地

養和醫院

香港跑馬地山村道2號李樹芬院4樓

電話：(852) 2835 8880 : (852) 2835 8890

傳真：(852) 2892 7510

eye@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

金鐘

養和醫健專科中心

香港金鐘道88號太古廣場一座21樓

電話：(852) 2855 6700

傳真：(852) 2523 7660

eye@hksh-healthcare.com

www.hksh-healthcare.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

眼瞼整形術



查詢或預約，歡迎聯絡我們



眼瞼整形手術主要用於縫合雙眼皮皺褶、糾正眼部浮腫或眼袋、解決因眼瞼下垂影響視野的情況，亦可糾正雙眼不對稱，從而改善視力和外觀。

上眼瞼手術

上眼瞼整形術在亞洲頗為普遍，常應用於為單眼瞼人士縫合雙眼瞼，或為眼皮過長的人士切除多餘的眼瞼皮膚。

雙眼瞼通常能使眼睛看來較大而明亮，而雙眼瞼成形術可以非常簡單，在毋須切口的情況下，把眼皮縫高、增加皺褶便成，好處是復原時間較短，但效果不能持久。如採用全切口方法，須於上眼皮內側切開皮膚，然後加線縫合及形成雙眼瞼，效果會較為持久。

針對眼瞼皮膚因老化鬆弛，令上眼皮過長下垂的情況，可考慮施行手術切除多餘皮膚，不但令外觀變得年輕，亦能解決因眼皮過長視野受阻的問題。



手術前

手術後

下眼瞼手術

「眼袋」是脂肪從皮下突出所致，常給人一種年老及疲倦的感覺。其中一種治療眼袋的方法是在結膜作一切口，將脂肪抽出並移除。經結膜施行手術的好處是不會在皮膚留下疤痕。

眼瞼下垂

眼瞼下垂是指上眼皮出現下垂的情況，可能影響其中一隻或雙眼，症狀包括視野受阻及容貌疲憊等。

眼瞼下垂的主要成因是負責提起眼瞼的提瞼肌因老化而變弱所致。其他因素包括長期戴上隱形眼鏡、經常用力揉眼睛以及患有神經系統疾病，如重症肌無力、動眼神經麻痺或霍納氏綜合症等，也會導致眼瞼下垂。

病人如出現眼瞼下垂必須盡快查找病因。如眼瞼下垂是源於神經疾病問題，有可能關乎嚴重疾病甚至危及生命，必須及時求醫。

如眼瞼下垂是由於提瞼肌鬆弛所致，透過手術矯正可有效改善。手術可以經皮膚或結膜切口進行，後者的好處是不會留下皮膚疤痕。

眼部整形及重建手術的其他應用

眼部的整形和重建手術是眼科的一個分支，主要負責施行眼部及眼眶周邊的整形及重建手術。除了上述的眼瞼整形術之外，手術範圍包括摘除眼眶腫瘤、重建因摘除腫瘤或外傷後的眼瞼組織，以及矯正與甲狀腺分泌失調有關的眼睛毛病，如眼球突出、眼瞼攣縮等。此外，手術亦可用於治療鼻淚管阻塞或修補眼眶周邊骨折等情況。