


哪些人較容易患視網膜脫落？

- 患有玻璃體後部剝離而引致視網膜撕裂的中年人士
- 視網膜有格子狀退化、萎縮性穿孔或馬蹄形撕裂
- 深近視（近視600度以上）
- 眼睛或眼眶創傷（包括手術）
- 患有某些遺傳性疾病（如馬凡氏綜合症、史蒂克勒綜合症等）
- 有視網膜脫落的家族病史
- 糖尿病性視網膜病變
- 早產嬰兒視網膜病變等

定期檢查 保護視力

請定期接受眼科檢查，以便及早診斷和治療各種眼疾，確保眼睛健康，為您守護視力。



視網膜邊緣退化和裂孔

養和眼科中心

跑馬地

養和醫院

香港跑馬地山村道2號李樹芬院4樓

電話：(852) 2835 8880；(852) 2835 8890

傳真：(852) 2892 7510

eye@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

金鐘

養和醫健專科中心

香港金鐘道88號太古廣場一座21樓

電話：(852) 2855 6700

傳真：(852) 2523 7660

eye@hksh-healthcare.com

www.hksh-healthcare.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時


星期日及公眾假期休息


敬請預約

查詢或預約，歡迎聯絡我們



飛蚊症及 視網膜脫落





玻璃體液化、退化及飛蚊

何謂飛蚊症？


我們眼球內的晶狀體和視網膜之間充滿著啫喱狀的組織，稱為玻璃體。隨著年紀增長，玻璃體會逐漸退化和液化，這個過程會導致我們看到一些黑點或線條在視線中漂浮，俗稱「飛蚊」。飛蚊的大小和形狀多種多樣，如：小點、圓形、線狀或網狀等。

因老化而出現的飛蚊數目較少，通常當我們注視着明亮而純色的背景（如白牆或藍天）時才會出現。而這種因生理變化的飛蚊症，並不會隨着時間而改變，是玻璃體退化過程中的正常現象。


閃光、急性玻璃體後部剝離和視網膜脫落

因疾病導致的飛蚊數目較多且會突然出現，病因包括眼球內出血、虹膜炎，亦可能由於玻璃體收縮引致玻璃體和眼底視網膜分離，出現急性玻璃體後部剝離(Posterior Vitreous Detachment, PVD)。而由於玻璃體拉扯視網膜，患者亦可能見到「閃光」。

飛蚊及閃光都是視網膜撕裂的症狀，如果視野有部分缺損，很可能已出現視網膜脫落。因此，如突然出現飛蚊或閃光，應立即找眼科專科醫生接受放瞳檢查，以準確診斷成因。如未能及時治理，視網膜撕裂有可能會逐步惡化為視網膜脫落。



玻璃體後部剝離




視網膜撕裂及脫落

視網膜脫落的徵狀

- 飛蚊增加
- 閃光增加
- 視野缺損
- 視覺影像變形或受阻

視網膜脫落的治療

視網膜退化或撕裂可以用激光修補，但視網膜脫落就必須以手術治療。手術主要分為兩種，一種是在眼球外施行的鞏膜外壓術，另一種是在眼球內進行的玻璃體切除術及氣體或硅油注射。兩種手術均包括冷凍療法或視網膜激光治療。



玻璃體切除術